

RI検査一覧表

検査種	使用薬剤	Delay Time	撮影時間	前処置	予約時の注意
IMP脳血流	^{123}I -IMP	15分	30分	なし	3D-SSP解析
DATスキャン	^{123}I -DAT Scan	3時間	30分	なし	アルコールアレルギー禁忌
唾液腺	$^{99\text{m}}\text{TcO}_4^-$	直後	60分前後	検査2時間前 絶飲食	
甲状腺摂取率	^{123}I ヨードカプセル	3時間+24時間	20分+20分	2週間ヨード制限(最低1週間)	3時間後の撮影は月、火、木
副甲状腺	$^{99\text{m}}\text{Tc}$ -MIBI	直後+2時間	40分+40分	なし	
骨シンチ	$^{99\text{m}}\text{Tc}$ -リン酸化合物	骨メタの場合 3時間	40分	なし	
		骨髄炎の場合 直後+3時間	60分+40分	なし	骨髄炎の場合 炎症部の明記をお願いします
MIBGシンチ	^{123}I -MIBG	15分+3時間	15分+15分	なし ヨード禁忌	
TlCl心筋血流	$^{201}\text{TlCl}$ (負荷なし)	直後+3時間	40分+30分	絶飲食、検査間は水と茶OK	
レノグラム	$^{99\text{m}}\text{Tc}$ -MAG3(負荷なし)	直後	40分	排尿、30分前に水300ml負荷	